

Вих. № 08/12-01р  
від 10.12.2021 року

Державна служба України з  
лікарських засобів та  
контролю за наркотиками  
пр-т Перемоги, 120-А, м. Київ,  
03115

ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА» (Код за ЄДРПОУ – 34414427) висловлює Вам свою повагу та як уповноважений представник в Україні виробника медичних виробів Фарма Лайн С.р.л., Віа Бертані 2, 20154 Мілан, Італія (Pharma Line S.r.l., Via Bertani 2, 20154 Milan, Italy), що діє на території України за Довіреністю від 12.11.2021р., щодо медичного виробу клас ІІа

**Спрей назальний «ФЛУ-АЦИЛ рино»,**

(сертифікат про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів №UA.MD.436-21 від 04.11.2021р.) повідомляє наступне:


у зв'язку із технологічними причинами на первинній упаковці медичного виробу Спрей назальний «Флу-ацил рино», 30 мл, партія 2129203, не було нанесено номер органу з оцінки відповідності поряд з нанесеним знаком відповідності технічному регламенту. На вторинній упаковці та на інструкції із застосування номер органу з оцінки відповідності нанесено поряд зі знаком відповідності.

Зазначена невідповідність не впливає на якість, безпеку чи ефективність медичного виробу і не несе шкоди чи ризику для здоров'я споживача та буде усунена для всіх наступних партій.

Фото маркування медичного виробу Спрей назальний «Флу-ацил рино», 30 мл, партія 2129203 додається.

З повагою,

Керівник групи з реєстрації  
ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  
«ПРО-ФАРМА»



О.В. Дмитренко



# ФЛУ-АЦИЛ

ФУНГІЦИД  
СПРЕЙ НАСАДЛИНИЙ



ПРОТИНАБРЯКОВИЙ  
ЗАСІБ З МІКООЛІТИЧНОЮ  
АКТИВНІСТЮ

000 000 0000



Застосовувати на 2-3 тижні після появи симптомів захворювання. Застосовувати на 2-3 тижні після появи симптомів захворювання.

**Особливі заходи безпеки.** Після закінчення роботи з препаратом необхідно одразу ж вийти на свіже повітря. При застосуванні не вдихати пари препарату. Не вживати їжу, напої та тютюнові продукти протягом 2 годин після застосування. Не вживати алкоголь протягом 24 годин після застосування. Не вживати ліки протягом 24 годин після застосування. Не вживати ліки протягом 24 годин після застосування.

Уважно слід читати інструкцію при використанні препарату. Застосовувати препарат на відстані не менше ніж 2 м від людини та худі тварин. Застосовувати препарат на відстані не менше ніж 2 м від людини та худі тварин.

Виробник: Флора Лайв С.б.д.а. Via Bertan 2, 20154 Milan, Italy

Імпортер: АГРО-ІНВЕСТОР - ПР-СІД

Адрес: вул. Київська, 11, Київ, Україна. Тел: +38 (044) 422 50 70

Детальні інструкції застосування завантажте за адресою: [www.agroinvestor.com](http://www.agroinvestor.com)

Олія: 1 флакон 30 ml (мл) екстракту  
N-ацетилцистеїну 1.6 g (г) екстракту  
0.9 (г) допоміжної речовини, неактивної  
середнього алетату, вода очищена. Без консервантів. Термін придатності 2 роки  
для використання. Після вжиття  
використати протягом 2 місяців. Уникати  
гнати зберігати при температурі не вище  
випускному для дітей. Не вживати  
вста та джерел тепла.

ml (мл) містить: діюча  
речовина N-ацетилцистеїн 1.6 g (г)  
0.9 (г) допоміжної речовини, неактивної  
середнього алетату, вода очищена. Без консервантів.  
Термін придатності 2 роки від  
випускного виробництва. Уникати  
гнати зберігати при температурі не вище 25°C у  
випускному для дітей. Не вживати  
вста та джерел тепла.

2129203

Відкриття використати протягом 2  
місяців.  
**УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК**  
(найменування та місцезнаходження і номер телефону підприємства)  
яке здійснює функції щодо при-  
ймання претензій від споживачів і  
ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛ АГЕНСТВО  
ПРО-ФОРМА» (вул. Перемоги, 2  
00120 м. Київ, Україна)  
Тел. (044) 240-00-00  
www.interagency.com.ua  
Стор. 1 з 1