

SOLIRIS®
300 mg/30 mL
Konsantre infüzyon çözeltisi

Eculizumab

30 mL'lik bir flakon (10 mg/mL)

**Damar içine uygulanır
Kullanılmadan önce seyreltilmelidir.**

ALEXION

SOLIRIS®

300 mg/30 mL

Konsantre infüzyon çözeltisi

Eculizumab

Formülü

Etkin madde:

30 mL'lik bir flakon 300 mg Eculizumab (10 mg/mL) içerir. Eculizumab, rekombinant DNA teknolojisi yoluyla NS0 hücre hattında üretilmiş bir insan monoklonal IgG_{2k} antikorudur. Seyreltme işleminden sonra infüzyonla uygulanacak olan çözeltinin nihai konsantrasyonu 5 mg/mL'dir.

Yardımcı maddeler: Sodyum fosfat monobazik, sodyum fosfat dibazik, sodyum klorür (ilave bilgi için kullanma talimatına bakınız), polisorbitat 80 ve enjeksiyonluk su.

SOLIRIS®

300 mg/30 mL

Konsantre infüzyon çözeltisi

Eculizumab

30 mL'lik bir flakon (10 mg/mL)

Damar içine uygulanır
Kullanılmadan önce seyreltilmelidir.

ALEXION

PL2645/3

701017

Parti no: 1002160

Son Kul. Ta.: 05 2024

SOLIRIS®

300 mg/30 mL

Konsantre infüzyon çözeltisi

Eculizumab



8 680131 470013 >

Ruhsat Sahibi: Alexion İlaç Ticaret Ltd. Şti.
İçerenköy Mahallesi Umut Sk.
And Ofis Sit. No: 10-12/73
Ataşehir/İstanbul

Ruhsat Numarası:
02.10.2015-2015/806

Üretim Yeri: Alexion Athlone
Manufacturing Facility, Athlone/
Roscommon/İrlanda



Konsantre infüzyon çözeltisi

SOLIRIS®
300 mg/30 mL


Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz.

2°C - 8°C arasında buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız. Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız. Orijinal ambalajındaki flakonlar yalnızca bir kez en fazla 3 günlük bir süre için buzdolabından çıkarılabilir. Bu sürenin sonunda ürün tekrar buzdolabına konulabilir. Tıbbi ürün seyreltildikten sonra 2-8°C arasında saklanmak koşuluyla 24 saat içerisinde kullanılmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Steril
SOLIRIS®'i intravenöz puşe ya da bolus enjeksiyon olarak uygulamayınız. Kesilmiş veya açılmış ambalajları satım almayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz. Reçete ile satılır.






...dir.
...da bolus
...miz.
...limatını



PL2645/3 701017

Parti No: 10021

Son Kul.Ta.. 05 202



SOLIRIS®


300 mg / 30 mL
Konsantre infüzyon çözeltisi

Eculizumab

Damar içine uygulanır.

30 mL (10 mg/mL)

ALEXION



20205

dan önce seyreltilmelidir.
intravenöz puşe ya da bolus
olarak uygulamayınız.
dan önce kullanma talimatını

