



ТОВ «РІЧ ГРУП ЮА»
Юридична адреса: м. Київ, вул. Татарська, 21,
Код ЕДРПОУ 42910782
Тел: +38 (066) 7200631

Вих. № 1 від 04.11.2024

Державна служба з лікарських
засобів та контролю за наркотиками
03115, м. Київ,
пр. Берестейський, 120 А

Щодо виявлених невідповідностей

ТОВ «РІЧ ГРУП ЮА», яке є уповноваженим представником виробника ТОВ «ДАН ФАРМ», Ізраїль, висловлює свою повагу та повідомляє про виявлену нами невідповідність у маркуванні **медичного виробу** (клас ризику – I клас) **ПРЕСТО ГЕЛЬ® ректальний гель / PRESTO GEL® rectal gel**, серія 23103B, розмір серії 8100 уп.

В Інструкції до застосування медичного виробу відсутній розділ «Дата останнього перегляду».

Просимо прийняти до уваги, що вищезазначена невідповідність має виключно технічний характер і жодним чином не несе ризиків та не призводить до негативних наслідків, що можуть вплинути на здоров'я або життя споживача (користувача) та жодним чином не впливають на якість та безпеку виробу.

Крім того повідомляємо, у зв'язку із тим, що на складі на сьогодні є залишки вищезазначеного медичного виробу із зазначеною невідповідністю, деякий час в обігу буде перебувати медичний виріб з цією інструкцією із застосування.

На даний момент компанія розробляє інструкцію, що буде відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 і гарантує, що вищевказана невідповідність буде усунена.

Просимо прийняти до уваги дане повідомлення та розмістити дану інформацію на сайті

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в категорії: «Повідомлення від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції».

Додаток 1: макет інструкції.

Директор ТОВ «РІЧ ГРУП ЮА»

К.С. ШЕВЦОВА
(П.І.Б.)



Виконавець: Міквабішвілі М.В.
+380632623678
krivinchuk.m@ukr.net

UA

Будь ласка, уважно прочитайте інформацію перед використанням!

ПРЕСТО ГЕЛЬ® ректальний гель PRESTO GEL® rectal gel

Медичний виріб

Інструкція до застосування

ПРЕСТО ГЕЛЬ® ректальний гель (PRESTO GEL® rectal gel) – формула швидкої дії активних компонентів для профілактики і затогеніза геморою та тріщин в ділянці заднього проходу, зменшення болю, запалення, печіння, свербіння, подразнення та інших неприскіпних симптомів.

Алюмінієвий тубик, 25 г

СКЛАД:

Інгредієнт	Вміст в 25 г
Вода	93,58 %
Порошок соку листя аloe Barbadensis	3,0 %
Триетаноламін	1,5 %
Карбомер	1,0 %
Екстракт листя погостемону Cablin (пачупі)	0,7 %
Екстракт герані Thunbergii	0,22 %

ПРЕСТО ГЕЛЬ ректальний гель не містить жодного аромату та інгредієнтів тваринного походження.

МЕХАНІЗМ ДІЇ складових:

Порошок соку листя аloe Barbadensis - має бактерицидні властивості, активний відносно таких бактерій, як стрептокок, стафілокок, дифтерійна і дизентерійна палички. При запальніх захворюваннях, своїх ранах прискорює процес регенерації, затоскиння ран, зменшує рубці. Аloe діє як імуномодулятор, сприяючи загальному оздоровленню організму.

Екстракт листя погостемону Cablin (пачупі) - надає протизапальну, противібрекову, фунгіцидну, бактерицидну, вірулецідну і сечогінну дію, сприяє затоскоєнню ран та усуває свербік.

Екстракт герані Thunbergii - містить вітаміни (філохіон і аскорбінову кислоту), крохмаль, камедь, антоціани, флавоноїди, фітонциди, алкалоїди, сапоніни, таніни, пектин, органічні кислоти, вуглеводи, галову кислоту, дубильні речовини і ефірні масла. Володіє бактерицидною, противірусною, протизапальною, зневільнюючою, детоксикаційною, заспокійливовою дією, зупиняє кров. Сприяє регенерації тканин при ранах, травмах, опіках, виразках, фурнукулах.

Карбомер - pH-чутливий гелеутворюючий згущувач, який утримує навколо себе вологу, тим самим зволожуючи слизову. Зволожуюча

плівка на епітелії тримається досить довго, знимаючи дискомфорт. Не всмоктується у кровотік, не накопичується в тканинах, діє поверхнево.

Після нанесення ПРЕСТО ГЕЛЬ ректального гелю, через кілька секунд з'являється відчуття сильного місцевого охолодження, яке відразу значно полегшує біль, далі переходить в пряміше згіріянче відчуття. Створюється фізичний бар'єр проти бактеріальної інвазії, дезінфікується ділянка місця застосування.

Знищуючи бактеріальну інфекцію, ПРЕСТО ГЕЛЬ сприяє зниженню набрякості геморoidalних вузлів, що сприяє зменшенню запалення, скороченню кровоносних судин, допомагає зупинити кровоточу при запаленні слизової прямої кишки, запобігає контакту з фекальними кислотами і токсинами, що знаходяться в цій ділянці. Коли запальний механізм і процес поширення бактерій блокується, створюється ідеальні умови для прискорення регенерації клітин і затоскоєння ран. Негайним результатом є полегшення і заспокоєння болю, почуття розлікання і дискомфорту в анальній області. ПРЕСТО ГЕЛЬ ректальний гель має в'язкучу дію, сприяє зміцненню судинної стінки, нормалізації стабільного кровопостачання, розслабленню м'яких тканин, що виключає повторне утворення запалених вузлів. Консистенція ПРЕСТО ГЕЛЬ сприяє його рівномірному розподілу по слизовій прямої кишки або ануса.

Таким чином, ПРЕСТО ГЕЛЬ допомагає нейтралізувати основні чинники, що призводять до утворення геморою і сприяє процесу скорочення геморoidalних вузлів.

ПОКАЗАННЯ: Нівелювання симптомів (біль, тиск, набряк, печіння, свербік, подразнення, чутливість) та профілактика внутрішнього і зовнішнього геморою, тріщин анального отвору (гострі анальні тріщини), гострих і хронічних запальніх процесів в ділянці анального отвору і прямої кишки.

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: Перед використанням ПРЕСТО ГЕЛЬ ректального гелю та після кожного випорожнення кишечника промити шкіру теплою водою без мила і протерти м'якою тканиною.

Відкрити кришку на тубі, верхньою стороною протянути в тубі отвір і міцно прикурити наконечник для інтраектального введення. Ввести наконечник в задній прохід і обережно натиснути на тубік, видавити близько 250 мг гелю. Зняти наконечник, промити теплою водою після кожного використання. Закрити тубик кришкою. Також для введення гелю можна користуватися косметичними паличками.

Частота використання від 1 – 2 рази на день до 4 – 6, в залежності від виразності симптомів і частоти дефекацій. Немає обмежень, щодо кількості разів або тривалості часу використання ПРЕСТО ГЕЛЬ. Тривалість застосування – до досягнення очікуваних результатів.



У тих випадках, коли існують тріщини, може з'явитися невелике відчуття печіння в області заднього проходу, яке, як правило, припиняється через кілька хвилин.

Упаковки ПРЕСТО ГЕЛЬ ректального гелю (25 г) вистачає приблизно на 100 разів використання.

ВАГІНІСТЬ І ЛАКТАЦІЯ: ПРЕСТО ГЕЛЬ ректальний гель можна застосовувати вагітним та жінкам після пологів.

ДПТ: використовувати дітам старше 7 років. Для дітей до 7 років тільки під наглядом та за рекомендацією лікаря.

ПОБІЧНІ ДІЇ: індивідуальна непереносимість до компонентів гелю. Іноді можуть виникати місцевий висип, подразнення або свербіж (рідко), підвищена активність кишківника, які, зазвичай, зникають незабаром після адаптації до гелю.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: Тільки для зовнішнього (ректального) використання.

Уникати потрапляння в очі.

У разі частої кровоточивості слід припинити застосування і звернутися до лікаря.

ФОРМА ВИПУСКУ: Герметична алюмінієва туба з пластмасовою кришечкою, маса вмісту туби 25г. Пластмасовий наконечник для інтраректального введення.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: Дата терміну придатності вказана на коробці. Не застосовувати засіб, якщо упаковка відкрита або пошкоджена.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі не вище 30°C у недоступному для дітей місці. Берегти від попадання прямих сонячних променів.

УТИЛІЗАЦІЯ: Прострочений продукт повинен утилізуватися відповідно до правил управління відходами Local Entity Manager. Ні в якому разі не викидати продукт в навколошнє середовище. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

■ Виробник та місце виробництва:

ТОВ «ДАН ФАРМ», А-біль 34/6, Емек Сарах Індустріал Зоне, Beer-Sheva, Ізраїль.

DAN PHARM LTD, 34/6 Ha'Bedil st. Emek Sarah

Industrial Zone, Be'er-Sheva, Israel.

Тел.: (+972) 8-623-5275

Факс: (+972) 8-627-4244

e-mail: mail@danpharm.co.il

<https://www.danpharm.com/>



**УПОВНОВАЖЕНИЙ
ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:**

ТОВ «РІЧ ГРУП ЮА»

Україна, 04101, м. Київ, вул. Татарська, 21.

Тел.: +38 (066) 7200631

<https://www.richpharma.ua/>



AZ

Tərkibi:

Aloe vera yarpaqların tozu (Aloe Barbadensis leaf Juice Powder) 3.000 mq, Su, trietanolamin, karbomer, paçuli yarpaqların ekstraktı (Pogostemon Cablin leaf extract), geran gülü ekstraktı (Geranium Thunbergii Extract).

İstifadəsinə göstərişlər:

- * Xarici və daxili hemoroy
- * Anal və anal ətrafi nahiyyədə diskomfort (çat, qışma, göynəmə, ağrı, quruluq, qızartı, iltihab və s.)

İstifadə qaydası və dozasi:

Gün ərzində gel 1-2 dəfə (0,5 sm tubdan sıxılır) düz bağırsağa yerdilir və anal ətrafi nahiyyəyə çəkilir.

Qeyd:

25 q tub təxminə 100 dəfə istifadə üçün nəzərdə tutulub.

Presto Gelin istifadəsindən dərhal sonra sərinləşmə hissi olur, bu hal qısa müddət ərzində heç bir müdaxilə olunmadan keçil gedir.

Gün ərzində şam 1-2 dəfə düz bağırsağa yeridilir.

Buraxılış forması:

Karton qutuda gel 25 q tubda içlik vərəqə ilə birlikdə qablaşdırılır.

Karton qutuda şam 12 ədəd içlik vərəqə ilə birlikdə qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti:

30°C-dən aşağı olan temperaturda quru, sərin və սազların əli çatmayan yerdə saxlamalı lazmıdır.

Yararlılıq müddəti:

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Istehsalçı:

Dan Pharm Ltd.
Beer Sheva , Izrael.

Marketing lisenziya sahibi:

Rich Group Ru LTD
11, Atlasova küç., 108811, Moskva, Rusiya

Ver. 02 / 29-10-2019 Cat. No. 7290011746001UA