
Aclasta®
5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon
SANDOZ
Aclasta®
5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon
SANDOZ

Aclasta 5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik Asit
Steril
Damar içine uygulanır.

Formülü:
1 flakon (100 ml) etkin madde olarak 5.330 mg Zoledronik asit monohidrat'a eşdeğer 5.0 mg zoledronik asit (anhidroz) içerir.

Yardımcı maddeler:
4950.0 mg mannitol, 30.0 mg sodyum sitrat, y.m. enjeksiyonluk su, y.m. nitrojen.

Ruhsat sahibi: Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Suryapı & Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah.
Şehit Sinan Eroğlu Cad. No: 6 34805
Kavacık/Beykoz/İstanbul

Üretim yeri: Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz/Avusturya
Novartis Pharma AG Basel/İsviçre'den ithal edilmiştir.

Ruhsat numarası: 11.12.2017-2017/923

- Açılmamış şişeleri 25°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
- İnfüzyonluk çözelti ilk kez açıldıktan sonra çözelti, HEMEN kullanılmalıdır.
- Kabın ilk kez açılması, uygulama ve uygulama bitimi arasındaki toplam süre 24 saatten fazla olmamalıdır.
- Açıldıktan sonra kullanılmayacaksa en fazla 24 saat, 2-8°C'de bekletilmesi uygundur.
- Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz.
- Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.
- Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
- Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız.
- Reçete ile satılır.



Aclasta 5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik Asit
Steril
Damar içine uygulanır.

Formülü:
1 flakon (100 ml) etkin madde olarak 5.330 mg Zoledronik asit monohidrat'a eşdeğer 5.0 mg zoledronik asit (anhidroz) içerir.

Yardımcı maddeler:
4950.0 mg mannitol, 30.0 mg sodyum sitrat, y.m. enjeksiyonluk su, y.m. nitrojen.

Ruhsat sahibi: Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Suryapı & Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah.
Şehit Sinan Eroğlu Cad. No: 6 34805
Kavacık/Beykoz/İstanbul

Üretim yeri: Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz/Avusturya
Novartis Pharma AG Basel/İsviçre'den ithal edilmiştir.

Ruhsat numarası: 11.12.2017-2017/923

- Açılmamış şişeleri 25°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
- İnfüzyonluk çözelti ilk kez açıldıktan sonra çözelti, HEMEN kullanılmalıdır.
- Kabın ilk kez açılması, uygulama ve uygulama bitimi arasındaki toplam süre 24 saatten fazla olmamalıdır.
- Açıldıktan sonra kullanılmayacaksa en fazla 24 saat, 2-8°C'de bekletilmesi uygundur.
- Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz.
- Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.
- Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
- Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız.
- Reçete ile satılır.




Aclasta®
5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon
SANDOZ
Aclasta®
5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon
SANDOZ


Aclasta®
5 mg/100 ml
IV İnfüzyonluk Çözelti
(01)08681428690442
(21)43950000301029
LOT:
EXP:
PR1607
12 2027
Aclasta®
5 mg/100 ml
IV İnfüzyonluk Çözelti
(01)08681428690442
(21)43950000311422
LOT:
EXP:
PW0382
12 2027



Aclasta®
5 mg/100 ml
IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon
Aclasta®
5 mg/100 ml
IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon


PR1607
12 2022


Damar içine uygulanır.
Ruhsat numarası:
11.12.2017 - 2017/923
Ruhsat sahibi:
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş
Üretim yeri:
Fresenius Kabi Austria GmbH
Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz/Avusturya


Aclasta®
5 mg/100 ml IV


Aclasta


Aclasta®
5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon
SANDOZ
Aclasta®
5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon
SANDOZ


Aclasta®
5 mg/100 ml
IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon
Aclasta®
5 mg/100 ml
IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon


Aclasta®
5 mg/100 ml
IV İnfüzyonluk Çözelti
(01)08681428690442
(21)43950000313212
LOT: PW0382
EXP: 12 2027
Aclasta®
5 mg/100 ml
IV İnfüzyonluk Çözelti
(01)08681428690442
(21)43950000313211
LOT: PW0382
EXP: 12 2027


АКЛАСТА Р-Н Д/ІНФ
5МГ/100МЛ 100МЛ №1 ФЛ
3084238.3 1283
EC12.27 PW0382
Aclasta®
5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon
SANDOZ
АКЛАСТА Р-Н Д/ІНФ
5МГ/100МЛ 100МЛ №1 ФЛ
3084238.1 1283
EC12.27 PW0382
Aclasta®
5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon
SANDOZ

Aclasta 5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik Asit
Steril
Damar içine uygulanır.

Formülü:
1 flakon (100 ml) etkin madde olarak 5.330 mg
Zoledronik asit monohidrat'a eşdeğer 5.0 mg

АКЛАСТА розчин д/інф. у флак. 5 мг/100 мл 100мл №1

Лікарська форма: Розчин для інфузій.

Склад: 100 мл розчину містить 5 мг золедронової кислоти (безводної), що відповідає 5,33 мг золедронової кислоти моногідрату

Категорія відпуску: За рецептом

Умови зберігання: Нерозкритий флакон не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати протягом 24 годин при температурі 2–8 °С після розкриття флакона. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Виробник: НОВАРТИС ФАРМА ШТЕЙН АГ, Швейцарія

Ruhsat numarası: 11.12.2017-2017/923

- Açılmamış şişeleri 25°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
- İnfüzyonluk çözelti ilk kez açıldıktan sonra çözelti, HEMEN kullanılmalıdır.
- Kabın ilk kez açılması, uygulama ve uygulama bitimi arasındaki toplam süre 24 saatten fazla olmamalıdır.
- Açıldıktan sonra kullanılmayacaksa en fazla 24 saat, 2-8°C'de bekletilmesi uygundur.

Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız.

Reçete ile satılır.



Aclasta 5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik Asit
Steril
Damar içine uygulanır.

Formülü:
1 flakon (100 ml) etkin madde olarak 5.330 mg

АКЛАСТА розчин д/інф. у флак. 5 мг/100 мл 100мл №1

Лікарська форма: Розчин для інфузій.

Склад: 100 мл розчину містить 5 мг золедронової кислоти (безводної), що відповідає 5,33 мг золедронової кислоти моногідрату

Категорія відпуску: За рецептом

Умови зберігання: Нерозкритий флакон не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати протягом 24 годин при температурі 2–8 °С після розкриття флакона. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Виробник: НОВАРТИС ФАРМА ШТЕЙН АГ, Швейцарія

- Açılmamış şişeleri 25°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
- İnfüzyonluk çözelti ilk kez açıldıktan sonra çözelti, HEMEN kullanılmalıdır.
- Kabın ilk kez açılması, uygulama ve uygulama bitimi arasındaki toplam süre 24 saatten fazla olmamalıdır.

Açıldıktan sonra kullanılmayacaksa en fazla 24 saat, 2-8°C'de bekletilmesi uygundur.

Kullanmadan önce kullanma talimatını okuyunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Kesilmiş veya açılmış ambalajları satın almayınız.

Reçete ile satılır.

Ruhsat numarası: 11.12.2017-2017/923








Damar içine uygulanır.
Ruhsat numarası:
11.12.2017 - 2017/523
Ruhsat sahibi:
Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş
Üretim yeri:
Fresenius Kabi Austria GmbH


PW0382
12 2027





Серія PR1607:


Aclasta®
5 mg/100 ml
IV İnfüzyonluk Çözelti
(01)08681428690442
(21)43950000200248
LOT:
EXP:
PR1607
12 2027


Aclasta®
5 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Zoledronik asit
Steril
Damar içine uygulanır.
100 ml x 1 flakon
SANDOZ

Aclasta 5 mg/100 ml IV АКЛАСТА розчин д/інф. у фл.: 5 мг/100 мл 100мл №1
Zoledronik Asit
Steril
Damar içine uygulanır.

Formülü:
1 flakon (100 ml) etkin m
Zoledronik asit monohidr
zoledronik asit (anhidroz

Yardımcı maddeler:
4950.0 mg mannitol, 30.
y.m. enjeksiyonluk su, y.

Ruhsat sahibi: Sandoz İl
Suryapı & Akel İş Merke
Şehit Sinan Eroğlu Cad.
Kavacık/Beykoz/İstanbul

Üretim yeri: Fresenius K
Hafnerstrasse 36 A-805
Novartis Pharma AG Basi

Ruhsat numarası: 11.12.2017-2017/923